




# Impfkalender 2016/2017 – Welche Impfungen sind empfohlen?

Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO), Stand August 2016

 Säuglinge und Kleinkinder  
(2 – 23 Monate)

 Kinder und Jugendliche  
(2 – 17 Jahre)

 Erwachsene  
(ab 18 Jahre)

Impfungen	Säuglinge und Kleinkinder (2 – 23 Monate)					Kinder und Jugendliche (2 – 17 Jahre)				Erwachsene (ab 18 Jahre)		
	6 Wochen	2 Monate	u4 3 Monate	4 Monate	u6 11–14 Monate	u7 15–23 Monate	2–4 Jahre	u9 5–6 Jahre	J1 9–14 Jahre	15–17 Jahre	ab 18 Jahre	ab 60 Jahre
Tetanus >		G1	G2	G3	G4	N	A1	A2			A (alle 10 Jahre)	
Diphtherie >		G1	G2	G3	G4	N	A1	A2			A (alle 10 Jahre)	
Keuchhusten (Pertussis) >		G1	G2	G3	G4	N	A1	A2			A <sup>d</sup>	
Hib (Haemophilus influenzae Typ b) >		G1	G2	G3	G4	N						
Kinderlähmung (Poliomyelitis) >		G1	G2	G3	G4	N		A			ggf. N	
Hepatitis B >		G1	G2	G3	G4	N						
Pneumokokken >		G1 <sup>b</sup>		G2	G3	N						S <sup>f</sup>
Rotaviren >	G1 <sup>a</sup>	G2	(G3)									
Meningokokken C >					G (ab 12 Monaten)		N					
Masern >					G1	G2	N				S <sup>e</sup>	
Mumps >					3-fach-Impfung MMR	3-fach-Impfung MMR + Windpocken	N					
Röteln >					3-fach-Impfung MMR	3-fach-Impfung MMR + Windpocken	N					
Windpocken (Varizellen) >					G1	G2	N					
Gebärmutterhalskrebs (HPV) >									♀ G1+G2 <sup>c</sup>	♀ N <sup>c</sup>		
Grippe (Influenza) >												S (jährlich)

Personen mit chronischen Erkrankungen (jährlich) und für Schwangere

**u** Überlappungen mit Früherkennungsuntersuchung Kinder

**J** Überlappungen mit Früherkennungsuntersuchung Jugendliche

**G** Grundimmunisierung (bis zu vier Teilimpfungen G1–G4)

**N** Nachholimpfung (bei unvollständigem Impfschutz)

**S** Standardimpfung

**A** Auffrischungsimpfung

**♀** Impfeempfehlungen für Mädchen und junge Frauen

<sup>a</sup> die 1. Impfung möglichst ab vollendeter 6. Lebenswoche, je nach Impfstoff 2 bzw. 3 Schluckimpfungen (G2/G3) mit einem Mindestabstand von 4 Wochen

<sup>b</sup> Frühgeborene erhalten eine zusätzliche Impfung im Alter von 3 Monaten (insgesamt 4 Impfungen)

<sup>c</sup> je nach Impfstoff 2 Impfungen im Alter von 9–13 bzw. 9–14 Jahren, bei Nachholen der Impfung beginnend im Alter >13 bzw. 14 Jahren 3 Impfungen

<sup>d</sup> einmalige Auffrischung; möglichst mit der nächsten Impfung gegen Tetanus/Diphtherie/ggf. Poliomyelitis

<sup>e</sup> Impfung für alle nach 1970 Geborene mit unklarem Immunschutz

<sup>f</sup> einmalige Impfung ab 60 Jahre, je nach Gesundheitszustand ggf. Auffrischung